

סוג הבחינה: בחינת מתכונת
מועד הבחינה: מתכונת 10, בדרך לבגרות
מספר השאלון: 035471
קובץ: תשובות סופיות

מתמטיקה

4 יחידות לימוד - שאלון ראשון

הוראות

א.

משך הבחינה: ארבע שעות.

ב.

מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שלושה פרקים, ובהם שמונה שאלות.

פרק ראשון - סטטיסטיקה והסתברות

פרק שני - גאומטריה

פרק שלישי - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות רציונליות ושל פונקציות שורש

ענו על חמש מן השאלות 1-8 (לכל שאלה - 22 נקודות).

סך הנקודות שתוכלו לצבור לא יעלה על 100.

ג.

חומר עזר מותר בשימוש:

(1) מחשבון לא גרפי. אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון שיש בו אפשרות תכנות.

(2) דפי נוסחאות ל-4 יחידות לימוד.

ד.

הוראות מיוחדות:

(1) אין להעתיק את השאלה; יש לסמן את מספרה בלבד.

(2) יש להתחיל כל שאלה בעמוד חדש.

(3) יש להסביר את כל הפעולות, כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת. חוסר פירוט עלול

לגרום לפגיעה בציון.

השאלות בשאלון זה מנוסחות בלשון רבים, אף על פי כן על כל תלמידה וכל תלמיד להשיב עליהן באופן אישי.

בהצלחה!

תשובות סופיות

פרק ראשון - סטטיסטיקה והסתברות

שאלה 1

א. $z = 2$

ב. 97.72%

ג. 68 נורות

ד. $t = 700$

ה. 0.9544

ו. 0.9109

שאלה 2

א. ארבע נקודות: $(1, 8)$, $(2, 9)$, $(4, 12)$, $(5, 15)$

ב. $\bar{x} = 3$ שנים, $\bar{y} = 11$ אלף ש"ח

ג. $r \approx 0.981$

ד. $\hat{y} = 1.7x + 5.9$

ה. 11.85 אלף ש"ח (11,850 ש"ח)

שאלה 3

א. $\frac{1}{10}$

ב. $\frac{7}{20}$

ג. $\frac{2}{7}$

ד. $\frac{3}{5}$

פרק שני - גאומטריה

שאלה 4

א. שתייהן שוות ל- $\angle ACB$

ב. הוכחה (ז.ז.)

ג. $BE = 21$, $EC = 4$

ד. 6.25

שאלה 5

א. $\angle ABC = 90^\circ$

ב. 30

ג. $\angle EDC = \angle ABC$, $\angle E$ משותפת - דמיון ז.ז.

ד. $S_{CDE} = 3$; $k = \frac{EA}{EC} = \sqrt{10}$

פרק שלישי - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות רציונליות ושל פונקציות שורש

שאלה 6

א. מינימום: $x = -2$; מקסימום: $x = 2$

ב. עלייה: $-2 < x < 2$; ירידה: $x < -2$, $x > 2$

ג(1). $f(0) = 0$, $f(-2) = -5$

ג(2). יורדת עד המינימום $(-2, -5)$, עולה דרך הראשית עד המקסימום $(2, 5)$ ויורדת אחריו;

סימטרית סביב הראשית

ד. 10

שאלה 7

א. $f(x)$: II , $g(x)$: I

ב. $(2, 4)$

ג. ב- $2 < x \leq 4$

ד. 20 יח"ר

שאלה 8

א. $f(0) = \frac{4}{3}$, $g(0) = 0$, עבור $x < 0$; גרף א: f , גרף ב: g

ב. $M(1, 1)$

ג(1). $AB = f(t) - g(t)$

ג(2). $AB = 2$, $t = -1$

עוד מתכונות, בגרורות ופתרונות מלאים: www.guyai.co.il